

با اسمه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان
معاونت دانش پژوهان جوان



پاکستان دانش پژوهان جوان

مسابقه علمی برای جوانان، زنده کردن روح جست و جو و کشف واقعیت‌های است. «امام خمینی (ره)»

دفترچه سوالات مرحله اول

سی و سومین دوره المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۳

صبح - ساعت: ۹:۰۰

کد دفترچه: ۱

تعداد سوالات	مدت آزمون (دقیقه)
۳۰	۲۱۰

استفاده از ماشین حساب ممنوع است.

توضیحات مهم

- کد برگه سوالات شما ۱ است. این کد را در محل مربوط روی پاسخ‌نامه علامت بزنید. در غیر این صورت پاسخ‌نامه شما تصحیح نخواهد شد.
- توجه داشته باشید که برگه سوالات شما که در زیر هر یک از صفحه‌های این دفترچه نوشته شده است، با کد اصلی که در همین صفحه است یکن باشد.
- بلافاصله پس از آغاز آزمون تعداد سوالات داخل دفترچه و وجود همه برگه‌های دفترچه سوالات را بررسی نمایید. در صورت وجود هرگونه نقصی در دفترچه، در اسرع وقت مسئول جلسه را مطلع کنید.
- یک برگ پاسخ نامه در اختیار شما قرار گرفته که مشخصات شما بر روی آن نوشته شده است. در صورت نادرست بودن آن، در اسرع وقت مسئول جلسه را مطلع کنید.
- برگه پاسخ‌نامه را دستگاه تصحیح می‌کند، پس آن را تا نکنید و تمیز نگه دارید و به علاوه خوانا و پر رنگ بنویسید.
- پاسخ درست به هر سوال ۴ نمره مثبت دارد. پاسخ نادرست به هر سوال یک نمره منفی دارد.
- هرمراه داشتن هرگونه کتاب، جزو، یادداشت و لوازم الکترونیکی تلفن همراه، ماشین حساب و لب تاپ ممنوع است. هرمه داشتن این قبیل وسایل حتی اگر از آن استفاده نکنید یا خاموش باشد، تقلب محسوب خواهد شد.
- آزمون مرحله دوم برای دانش آموزان سال اول دبیرستان صرفه جنبه آزمایشی و آمادگی دارد و شرکت‌کنندگان در دوره تابستان از بین دانش آموزان پایه دوم و سوم دبیرستان انتخاب می‌شوند.
- داوطلبانی می‌توانند دفترچه سوالات را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند، در غیر این صورت دفترچه سوالات باید همراه پاسخ‌نامه تحويل داده شود.
- وبگاه کمیته علمی المپیاد ریاضی ایران www.mathysc.ac.ir است.

کلیه حقوق این سوالات برای پاکستان دانش پژوهان جوان محفوظ است



آزمون مرحله اول سی و سومین المپیاد ریاضی کشور

۱. در آزادراه زنجان-تبریز از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ صبح تا ۲۳۷۰ خودرو از عوارضی عبور کرده‌اند که همه آن‌ها تک‌سرنشین یا دو سرنشین بوده‌اند. این خودروها در مجموع ۱۸۳۲۰ لیتر بنزین در مسیر مصرف کرده‌اند. می‌دانیم هر خودروی تک‌سرنشین، ۷ لیتر و هر خودروی دوسرنشین، ۸ لیتر بنزین در این مسیر مصرف کرده است. تعداد کل خودروهای تک‌سرنشین چند تاست؟

۱) ۳۲۰ ۲) ۴۸۰ ۳) ۶۴۰ ۴) ۱۰۵۰ ۵) ۱۱۸۵

۲. در مثلث متساوی‌الساقین ABC که در آن $AB = AC$ ، نقاط X و Y روی پاره خط AC طوری قرار گرفته‌اند که X بین A و Y قرار دارد و به علاوه $AX = BX = YB$. اگر $\angle BAC = 10^\circ$ باشد، زاویه $\angle BAC$ چند درجه است؟

۱) $\frac{95}{3}$ ۲) ۳۸ ۳) ۴۰ ۴) ۴۱ ۵) $\frac{185}{5}$


۳. x و y دو عدد حقیقی هستند که $18 = 2^{x+1} = 2^{-y}$ و $2 = 2^{x+1} - 2^{-y}$. مقدار xy چقدر است؟

۱) -۲ ۲) -۱ ۳) ۲ ۴) $-\frac{1}{2}$ ۵) $\frac{1}{2}$

۴. چند عدد طبیعی کوچک‌تر از ۱۳۹۳ مثل a وجود دارد که مربع کامل باشد؟

۱) ۳۷ ۲) ۶۹۶ ۳) ۷۱۵ ۴) ۷۳۳ ۵) ۷۳۴

۵. نمودار تابع $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ را در پایین می‌بینید. $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: تابعی صعودی است که برای هر عدد حقیقی x ، $g(x) \leq f(x)$. حداقل مقدار $(g(x))$ کدام است؟



- ۱) ۰
- ۲) ۱
- ۳) ۲
- ۴) ۳
- ۵) ۴

$$\frac{1}{2} = \frac{(AB + \overline{AB})NM}{2}$$



$$T_{AB} = (AB + \overline{AB}) NM$$

$$T_{AC} = AB \cdot NM$$

$$= \text{مساحت} \frac{(AB + DC)NM}{2}$$



آزمون مرحله اول سی و سومین المپیاد ریاضی کشور



۶. در شهر نیستان قیمت نی‌ها با افزایش طول نی زیاد می‌شود. تاجری در شکرستان قصد وارد کردن نی از نیستان را دارد. در شکرستان لیوان‌ها به شکل مخروط ناقص با ارتفاع ۱۶ سانتی‌متر، قطر دهانه ۱۰ سانتی‌متر و قطر انتهای ۶ سانتی‌متر هستند. تاجر قصد دارد کمترین پول را خرج کند ولی با توجه به قوانین شکرستان به هیچ وجه نی نباید کاملاً داخل لیوان قرار گیرد. اندازه نی‌هایی که او می‌خرد چقدر است؟ (از قطر نی صرف نظر می‌کنیم، یعنی نی را یک پاره خط فرض می‌کنیم).

- (۱) $10\sqrt{3}$ (۲) $2\sqrt{87}$ (۳) $8\sqrt{5}$ (۴) $2\sqrt{89}$ (۵) $2\sqrt{73}$

۷. مجموعه $\{1, 2, \dots, 10\}$ چند زیرمجموعه ناتهی دارد که اختلاف بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عضو آن ۶ باشد؟

- (۱) ۳۲ (۲) ۶۴ (۳) ۱۲۸ (۴) ۲۵۶ (۵) ۱۰۲۴

۸. کشور شکرستان از سه استان نمکستان، فلفلستان و سماقستان تشکیل شده است که به ترتیب $n+1$ ، $n+2$ و $n+3$ شهر دارند. می‌دانیم تعداد شهروندان در شهرهای مختلف این کشور یکسان است و جمعیت کل کشور n^2+n+1 نفر است. عدد n در کدام یک از محدوده‌های زیر قرار دارد؟

- (۱) ۱ تا ۱۰ (۲) ۱۱ تا ۲۰ (۳) ۲۱ تا ۳۰ (۴) ۳۱ تا ۴۰ (۵) ۴۱ تا ۵۰

۹. $ABCD$ ذوزنقه‌ای است که در آن $AB = 3CD$ و $AB \parallel CD$. نقاط M و N به ترتیب وسط اضلاع BC و CD هستند و مساحت ذوزنقه ۳۲ است. مساحت مثلث AMN چه قدر است؟

- (۱) ۸ (۲) ۱۰ (۳) ۱۲ (۴) ۱۵ (۵) ۱۶

۱۰. برای چند مقدار صحیح n دو چندجمله‌ای $1 - nx + x^2 + \dots + x^n$ ریشه حقیقی مشترک دارند؟

- (۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳ (۵) بی‌نهایت



آزمون مرحلهٔ اول سی و سومین المپیاد ریاضی کشور

۱۱. حداکثر چند مثلث غیر همنهشت وجود دارد که طول اضلاع آن‌ها از بین اعداد $۱, ۲, ۴, ۸, \dots, ۲^{۱۰}$ باشند؟ (طول اضلاع می‌توانند با هم برابر باشند).

- (۱) ۵۵ (۲) ۶۶ (۳) ۹۰ (۴) ۱۲۰ (۵) ۱۶۵


۱۲. برای عدد طبیعی n چندجمله‌ای $P_n(x) = x + n^2$ تعریف می‌کنیم. می‌دانیم $P_1(x), P_2(x), \dots, P_{10}(x)$ یک چندجمله‌ای از درجه 10 است. ضریب x^{10-1} در این چندجمله‌ای برابر کدام است؟

- (۱) ۰ (۲) ۲۱۲۹۲ (۳) ۲۱۲۹۲ + ۱ (۴) ۲۱۲۹۲ - ۱ (۵) ۲۱۲۹۳

۱۳. فرض کنید $\{A, B, \dots, A\} = \{1, 2, \dots, 100\}$. تعداد توابع $f: A \rightarrow B$ برای هر دو عدد طبیعی m و n که $mn \leq 100$ و $2 \leq m, n \leq 10$ رابطه $f(mn) = mf(n)$ برقرار باشد.

- (۱) ۱۰۲ (۲) ۱۰۳ (۳) ۱۰۴ (۴) ۱۰۵ (۵) 2×10^5

۱۴. پادشاه شکرستان که قصری به شکل مربع دارد، به تازگی کتبه‌ای به خط نمکی مربوط به یکی از اجدادش پیدا کرده که ریاضی‌دان بوده است. پس از ترجمه کتبه توسط زبان‌شناسان مشخص شد که در نقطه‌های مختلفی از شهر، گنج‌هایی وجود دارد. ترجمه کتبه را در زیر می‌بینید.



گنج‌ها در نقطه‌هایی از شهر پنهان گشته‌اند که اگر هر کدام از آن‌ها را به ترتیب نسبت به ضلع شمالی، ضلع جنوبی، ضلع شرقی، ضلع غربی، قطر اول و درنهایت قطر دوم قصر قرینه کنیم به جای اول بازگردد.

چند گنج در شهر پنهان شده است؟

- (۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۴ (۵) ۸



آزمون مرحلهٔ اول سی و سومین المپیاد ریاضی کشور

۱۵. مهندس شش دیواری قصد دارد نقشه‌ی خانه‌ای با شش دیوار را طراحی کند. او می‌خواهد سه تا از دیوارها در امتداد شمالی-جنوبی و با طول‌های ۲، ۴ و ۶ متر باشند و سه تا از دیوارها نیز در امتداد شرقی-غربی و با طول‌های ۴، ۶ و ۱۰ متر باشند. او چند نقشه‌ی مختلف با این ویژگی‌ها می‌تواند بکشد؟

۲۴) ۵

۲۰) ۴

۱۶) ۳

۱۲) ۲

۸) ۱

۱۶. می‌دانیم عددی طبیعی در مبنای دو، ۳۰ رقمی است. در مورد تعداد ارقام این عدد در مبنای سه چه می‌توان گفت؟

(۱) حتماً ۱۸ رقمی است.

(۲) حتماً ۱۹ رقمی است.

(۳) حتماً ۲۰ رقمی است.

(۴) برای بعضی اعداد ۱۸ رقمی و برای بعضی ۱۹ رقمی است.

(۵) برای بعضی اعداد ۱۹ رقمی و برای بعضی ۲۰ رقمی است.

۱۷. عدد صحیح n را «نه چندان بزرگ» می‌گوییم هرگاه برای هر دو عدد مثبت x و y که $xy + \frac{1}{xy} \geq n$ داشته باشیم n بزرگ‌ترین عدد نه چندان بزرگ کدام است؟

۷) ۵

۶) ۴

۵) ۳

۳) ۲

۱) ۱

۱۸. رؤس یک پنج‌ضلعی محدب را به ترتیب ساعت‌گرد A, B, C, D, E می‌نامیم. می‌دانیم

$\angle EDA = \angle DCA = \angle CDA = \angle BAE = \angle BCA = ۲\angle DAC = ۹۳^\circ$. اگر $AD = ۲\sqrt{۳}$

آن‌گاه مقدار $\frac{AE}{AB}$ برابر کدام گزینه است؟

۳) ۵

۳ $\sin 93^\circ$) ۴ $\frac{1}{\sqrt{3}}$) ۳ $\frac{1}{2})$ ۲ $\frac{1}{\sqrt{3}} \sin 93^\circ$) ۱

۱۹. x و y دو عدد حقیقی هستند که $\sin(x) + \cos(y) = 1$ بیش‌ترین مقدار


کدام است؟

۲) ۵

۱ + $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$) ۴ $\sqrt{۳}$) ۳ $\sqrt{۳}$) ۲ $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$) ۱



آزمون مرحلهٔ اول سی و سومین المپیاد ریاضی کشور



۲۰. دو صفحهٔ پلاستیکی شفاف و رنگی به شکل دو دایرهٔ برابر داریم که هر کدام از آن‌ها توسط سه شعاع با زاویه‌های 120° ، به سه قسمت برابر تقسیم شده‌اند. قسمت‌ها دارای رنگ‌های متفاوت هستند. هرگاه دو رنگ روی هم قرار گیرند، رنگی جدید ایجاد می‌شود و رنگ‌های ترکیبی ایجاد شده نیز با یک‌دیگر متفاوت‌اند. مثلاً در شکل رو به رو 10° رنگ مختلف به وجود آمده است.

حداکثر تعداد رنگ‌های مختلفی که در یک وضعیت قرار گرفتن صفحه‌ها می‌تواند به وجود بیاید چند تاست؟

۱۵) ۵

۱۴) ۴

۱۳) ۳

۱۲) ۲

۱۱) ۱

۲۱. یک زیرمجموعهٔ ناتهی از اعداد طبیعی را «منظمه» گوییم اگر میانگین اعضای آن عددی طبیعی باشد و آن را «فوق منظم» گوییم اگر همهٔ زیرمجموعه‌های ناتهی آن منظم باشند. تعداد زیرمجموعه‌های فوق منظم پنج عضوی از مجموعه $\{1, 2, \dots, 67\}$ چند است؟

۴۷) ۵

۱۹) ۴

۱۴) ۳

۱۲) ۲

۱) ۰

۲۲. شش نقطه در صفحه داریم که هیچ سه تایی از آن‌ها هم خط نیستند. در بین زوایایی که این نقاط تشکیل می‌دهند، حداکثر چند زاویه در بازه $(90^\circ, 180^\circ)$ وجود دارد؟

۲۴) ۵

۲۰) ۴

۱۸) ۳

۱۲) ۲

۱) ۶

۲۳. نقطهٔ P روی کمان BC از دایرهٔ محیطی مثلث ABC (کمانی که شامل A نیست) قرار دارد. می‌دانیم $BC = 4$ و $AC = 2$. نقاط M و N روی خط BC قرار دارند به طوری که B بین C و M است و C بین N و B است. می‌دانیم $MA = PN$ بر دایرهٔ محیطی مثلث ABC مماس هستند و AP خط BC را در نقطهٔ T قطع می‌کند. اندازهٔ PT چقدر است؟

 $\frac{4\sqrt{10}}{5}$) ۵ $\frac{2\sqrt{15}}{3}$) ۴ $\frac{5\sqrt{12}}{7}$) ۳ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$) ۲۱) $\frac{4}{3}$



آزمون مرحله اول سی و سومین المپیاد ریاضی کشور


۲۴. عدد طبیعی M را خوب می‌نامیم هرگاه اعداد طبیعی نه لزوماً متمایز a_1, a_2, \dots, a_n باشند. یافتن شوند به طوری که $M = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n$ و خواص زیر برقرار باشد.

- (آ) M بر توان سوم هیچ عدد طبیعی بزرگ‌تر از یکی بخش‌پذیر نیست.
 (ب) اگر $n \leq i \leq n$ آن‌گاه $a_{i-1}a_i a_{i+1}$ بر a_i بخش‌پذیر است. ($a_{n+1} = a_1$ و $a_0 = a_n$)

چند عدد خوب کوچک‌تر از ۲۰۱۵ داریم؟

- ۷۲ (۵) ۴۴ (۴) ۲۹ (۳) ۲۶ (۲) ۲۲ (۱)

۲۵. متحرکی در فضا به گونه‌ای حرکت می‌کند که در لحظه t در نقطه $(x(t), y(t), z(t))$ قرار دارد. اگر نمودارهای $x(t)$ و $y(t)$ بر حسب t به شکل‌های زیر باشند، مسافتی که این متحرک از $t = 0$ تا $t = 8$ طی می‌کند برابر کدام گزینه است؟



- $16\sqrt{\frac{2}{3}}$ (۵) $8\sqrt{\frac{5}{3}}$ (۴) $8\sqrt{\frac{2}{3}}$ (۳) $4\sqrt{\frac{5}{3}}$ (۲) $\frac{8\sqrt{2}}{3}$ (۱)



آزمون مرحله اول سی و سومین المپیاد ریاضی کشور

۲۶. «پشیزها» موجوداتی میکروسکوپی هستند که اندازه‌های مختلفی دارند. هرگاه دو پشیز با اندازه‌های x و y در مجاورت هم قرار بگیرند، می‌توانند با صرف انرژی‌ای برابر $|x - y|$ به هم بچسبند و یک پشیز با اندازه‌ی $x + y$ ایجاد کنند.

اگر 1025 پشیز با اندازه‌ی 1 روی یک خط ردیف شده باشند، کمترین انرژی‌ای که باید در مجموع صرف کنند تا تبدیل به یک پشیز با اندازه‌ی 1025 شوند، چه قدر است؟

۳۲) ۵ ۳۱) ۴ ۱۱) ۳ ۱۰) ۲ ۹) ۱

۲۷. یک 9 ضلعی منتظم است و نقطه‌های K, M و N درون آن به گونه‌ای هستند که $A_1A_2A_4K$ متوازی‌الاضلاع و A_6A_7M و A_8A_9N مثلث‌هایی متساوی‌الاضلاع هستند. زاویه $MKN > \angle MKN$ چه قدر است؟

۶۰) ۵ ۴۵) ۴ ۴۰) ۳ ۳۰) ۲ ۲۰) ۱

۲۸. فرض کنید A مجموعه نکات با مختصات صحیح در صفحه باشد و تابع $f : A \rightarrow \{0, 1, 2\}$ دارای این خاصیت است که برای هر x و y صحیح،

$$f(x, y) - f(x + 1, y) - f(x - 1, y) - f(x, y + 1) - f(x, y - 1)$$

بر 3 بخش‌پذیر است. کدام گزاره صحیح است؟

- ۱) f باید تابعی ثابت باشد.
- ۲) مجموعه‌ای متناهی وجود ندارد که با دانستن f در آن مجموعه، تابع f به صورت یکتا تعیین شود.
- ۳) اگر مجموعه نکاتی که f در آن‌ها مقدار 1 را اتخاذ می‌کند، مشخص باشد (فرض کنید این مجموعه ناتهی است) تابع f به صورت یکتا تعیین می‌شود.
- ۴) اگر مقدار f را روی نکاتی که هر دو مؤلفه آن‌ها زوج است بدانیم، تابع f به صورت یکتا تعیین می‌شود.
- ۵) گزینه‌های 2 و 3



آزمون مرحله اول سی و سومین المپیاد ریاضی کشور

۲۹. مثلثی که طول هر سه ضلعش عددی در بازه $[1, 2]$ ، و اندازه همه زاویه هایش در بازه $[45, 90]$ درجه است، را «معتل» می گوییم. اختلاف مساحت دو مثلث معتدل حداقل چه قدر است؟


۵) هیچ کدام

۴) $\frac{12 - 3\sqrt{3}}{4}$

۳) $\sqrt{3}$

۲) $\frac{8 - \sqrt{2}}{2}$

۱) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$



۳۶۳ (۵)

۱۳۸۷ (۴)

۳۰. مثلثی متساوی الاضلاع به ضلع ۵ را به شکل رو به رو به مثلث هایی به ضلع یک تقسیم کرده ایم. به هر یک از رؤوس این شبکه بندی، برداری دلخواه به طول یک و موازی با یکی از اضلاع مثلث نسبت می دهیم. مجموع همه ای این بردارها چند حالت مختلف می توانند داشته باشد؟

۷۲۶ (۲)

۱۲۶ (۱)

