

با سمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان
ساعونت دانش پژوهان جوان



پاکستان دانش پژوهان جوان

مبارزه‌ی علمی برای جوانان، زنده کردن روح جست و جو و کشف واقعیت‌های است. «امام خمینی (ره)»

دفترچه‌ی سوالات مرحله‌ی اول

بیست و پنجمین دوره‌ی المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

صبح - ساعت: ۹:۰۰

کد دفترچه : ۱

مدت آزمون (دقیقه)	تعداد سوالات
۹۰	۴۰

استفاده از ماشین حساب مجاز است.

توضیحات مهم

- کد برگه‌ی سوالات شما ۱ است. این کد را در محل مربوط روی پاسخ‌نامه علامت بزنید. در غیر این صورت پاسخ‌نامه‌ی شما تصویح نخواهد شد.
- دقت کنید که برگه‌ی سوالات شما که در بالای هر یک از صفحه‌های این دفترچه نوشته شده است، با کد اصلی که در همین صفحه است یکی باشد.
- بالاقابله پس از آغاز آزمون تعداد سوالات داخل دفترچه وجود همه‌ی برگه‌های دفترچه‌ی سوالات را بررسی نمایید. در صورت وجود هرگونه نقصی در دفترچه، در اسرع وقت مستلزم جلسه را مطلع کنید.
- یک برگ پاسخ‌نامه در اختیار شما قرار گرفته که مشخصات شما بر روی آن نوشته شده است. در صورت نادوست بودن مشخصات برگه، در اسرع وقت مسؤول جلسه را مطلع کنید.
- برگه‌ی پاسخ‌نامه را دستگاه تصویح من کند، پس آن را تا نکنید و تبیز نگه دارید. پاسخ هر پرسش را با مداد مشکی فرم در محل مربوط علامت بزنید. خانه‌ی مورد نظر را کاملاً سیاه کنید.
- پاسخ درست به هر سوال ۳ نمره مشبت و پاسخ نادرست یک نمره منفی دارد.
- هرراه داشتن هرگونه کتاب، جزو و جدول تابوی عنصر مجاز نمی‌باشد.
- هرراه داشتن لوازم الکترونیکی نظیر تلفن همراه و لب تاپ منوع است. هرراه داشتن این قبیل وسائل حتی اگر از آن استفاده نکنید یا خاموش باشد، تقلب محسوب خواهد شد.
- آزمون مرحله‌ی دوم برای دانش آموزان سال اول دیپرستان صرفه‌ی آزمایشی و آمادگی دارد و شرکت‌کنندگان در دوره‌ی تابستانی از بین دانش آموزان پایه‌ی دوم و سوم دیپرستان انتخاب می‌شوند.
- داوطلبان می‌توانند دفترچه‌ی سوالات را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند، در غیر این صورت دفترچه باید هر راه پاسخ‌نامه تحویل داده شود.

کلیه حقوق این سوالات برای پاکستان دانش پژوهان جوان محفوظ است

کد دفترچه سوالات : ۱

۱- کدام عبارت درست است؟

- (۱) اصل آفنا (بناگذاری) ترتیب پرشدن اوربیتالهای یک زیر لایه را بیان می کند.
- (۲) رادرفورد توانست تابش های حاصل از مواد پرتوزا را به کمک مدل اتمی تامسون توجیه کند.
- (۳) تعداد اوربیتالها و جهت گیری آن ها را در فضا معین می کند.
- (۴) نخستین بار آنگستروم ، چهار خط طیف نشری اتم هیدروژن را یافت.

۲- به کدام ترکیب شیمیایی نمی توان هر دو اسم را نسبت داد؟

- (۱) استانیک سولفات - قلع (IV) سولفات $\text{Sn}(\text{SO}_4)_2$
- (۲) تراکلرومتان - کربن تراکلرید CCl_4
- (۳) آلومینیم تری اکسید - آلومینیم (III) اکسید Al_2O_3
- (۴) دی نیتروژن تری اکسید - نیتروژن (III) اکسید N_2O_3

۳- در کدام گزینه ترتیب انرژی های نمکیک پیوند نادرست است؟

- | | | | |
|--|-----------------------|---|---------------------|
| $\text{N}_2 > \text{N}_2\text{F}_2 > \text{N}_2\text{H}_4$ | (۲) نیتروژن - نیتروژن | $\text{CO}_2 > \text{CO} > \text{CO}_3^{2-}$ | (۱) کربن - اکسیژن |
| $\text{O}_2 > \text{O}_3 > \text{H}_2\text{O}_2$ | (۴) اکسیژن - اکسیژن | $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{F}_2 > \text{I}_2$ | (۳) هالوژن - هالوژن |

۴- در کدام گزینه همه عناصر یکسان در هر گونه ، اعداد اکسایش یکسان دارند؟

- | | |
|---|--|
| C_2H_2 ، $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ (۲) | K_2O_2 ، $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (۱) |
| N_3H ، P_4O_6 (۴) | $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ، Fe_3O_4 (۳) |

۵- شکل هندسی کدام دو گونه یکسان است؟

- | | |
|---|---|
| NO_3^- ، SnCl_3^- (۲) | SbCl_3 ، SeO_3 (۱) |
| SiF_4 ، XeF_4 (۴) | S_2O ، I_3^+ (۳) |

۶- در کدام گزینه رابطه بین زوایای پیوند درست است؟

(۱) زاویه پیوند $\overset{\wedge}{\text{CCC}}$ در الماس $>$ گرافیت $>$ پروپین




(۲) زوایای پیوند در دی کلرومتان $\overset{\wedge}{\text{HCH}} = \overset{\wedge}{\text{Cl}}\overset{\wedge}{\text{C}}\text{Cl} = \overset{\wedge}{\text{H}}\overset{\wedge}{\text{C}}\text{Cl}$:

(۳) زاویه پیوند $\overset{\wedge}{\text{Al}}\overset{\wedge}{\text{AlCl}}$:



کد دفترچه سوالات : ۱

۷- با توجه به تعداد الکترون های ظرفیت ، در چه تعداد از گونه های زیر ، X می تواند فلورور باشد؟





۱ (۴)

۲ (۳)


۳ (۲)

۴ (۱)

۸- کدام مقایسه نادرست است؟



۹- برای چه تعداد از گونه های زیر می توان ساختاری با پیوند سه گانه رسم کرد؟



۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۱۰- اگر هیدروژن و اکسیژن هر کدام تنها دارای دو نوع ایزوتوب باشند چند نوع مولکول آب اکسیژنه می تواند وجود داشته باشد؟

۱۲ (۴)

۹ (۳)

۱۰ (۲)

۸ (۱)

۱۱- کدامیک از جملات زیر نادرست است؟

(۱) پدیده پرتوزایی با کاهش جرم ماده پرتوزا همراه است.

(۲) پرتوهای کاتدی بر اثر برخورد با یک ماده فلورورست نورایجاد می کنند.

(۳) مواد دارای خاصیت فلورورسانس نور با انرژی معینی را جذب و سپس نور با طول موج کوتاهتری را نشر می کنند.

(۴) از اینکه در آزمایش ورق طلای رادرفورد تنها تعداد بسیار اندکی از ذرات آلفا با زاویه بیش از ۹۰ درجه از مسیر اولیه منحرف شدند می توان نتیجه گرفت که قطر هسته از قطر اتم بسیار کوچکتر است.

۱۲- اگر 5×10^{-3} مول از یک نمک متبلور حرارت داده شود، جرم آن 0.36 گرم کاهش می یابد. تعداد مولهای آب تبلور موجود در یک مول این نمک کدام است؟ ($O=16$ ، $H=1$)

۴ (۴)

۶ (۳)

۵ (۲)

۱۰ (۱)

۱۳- اتحلال پذیری یک نمک در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد برابر 100 گرم در 100 گرم آب و در دمای 80 درجه سانتی گراد برابر 250 گرم در 100 گرم آب است. اگر 14 گرم از محلول سیر شده این نمک از 80 درجه تا 20 درجه سرد شود چند گرم نمک رسوب خواهد کرد؟

۹ (۴)

۸ (۳)

۴ (۲)

۶ (۱)

کد دفترچه سوالات : ۱

۱۴- تعداد الکترون های ناپیوندی کدام گونه بیشتر است؟

N_2O_3 (۴)

ICl_3 (۳)

ICl_2^- (۲)

XeO_3 (۱)

۱۵- کدامیک از عبارت های زیر نادرست است؟

(۱) عامل اصلی ایجاد باران های اسیدی SO_2 می باشد.

(۲) دلیل توانایی حشرات در ایستاندن روی سطح آب، کم بودن کشش سطحی آب است.

(۳) در برخی کشورها، از روغن های گیاهی و حیوانی برای تولید سوخت استفاده می شود.

(۴) بیشتر حجم نفت تولیدی، به عنوان سوخت برای ایجاد گرمایش به کار می رود.

۱۶- فرض کنید هوا دقیقا شامل ۷۸ درصد مولی گاز N_2 ، ۲۱ درصد مولی گاز O_2 و ۱ درصد مولی گاز Ar است. اگر کل اکسیژن موجود در هوا را خارج کنیم، جرم مولی متوسط هوای باقیمانده چند گرم بر مول می شود؟ ($A=40/0$ ، $O=16/0$ ، $N=12/0$ ، $Ar=36/0$)

۲۸/۱۵ (۴)

۲۸/۵۶ (۳)

۲۸/۸۴ (۲)

۳۰/۹۶ (۱)

۱۷- دمای انجماد کدام محلول از همه پایین تر است؟

(۱) محلول 0.15 M مولال شکر در آب

(۲) محلول 0.10 M مولال $NaCl$ در آب

۱۸- اگر 75 ml لیتر محلول $180\text{ ppm} Ag^+$ با $450\text{ ppm} Cl^-$ مخلوط شود، تقریباً چند میلی گرم رسوب $AgCl$ تشکیل می شود؟ ($Ag=107/9$ ، $Cl=35/0$)

۱۷۹ (۴)

۱۳۰ (۳)

۱۰۵ (۲)

۸۲ (۱)

۱۹- مخلوطی از H_2S و CS_2 را در اکسیژن می سوزانیم تا H_2O ، CO_2 و SO_2 تولید شوند. جرم SO_2 حاصل، دقیقاً $3/85$ برابر جرم CO_2 تشکیل شده است. درصد جرمی H_2S در مخلوط اولی چقدر است؟ ($O=16$ ، $H=1$ ، $C=12$ ، $S=32$)

۲۹/۳ (۴)

۳۰/۱ (۳)

۲۲/۴ (۲)

۱۷/۶ (۱)

۲۰- در کدام گزینه همه نمک ها در آب محلول هستند؟

HgS ، PbS ، $AgNO_3$ ، $SrSO_4$ (۱)

$CaCl_2$ ، $NaBr$ ، $Pb(NO_3)_2$ ، $PbCl_2$ (۲)

K_2SO_4 ، Na_3PO_4 ، $CaCl_2$ ، $AgNO_3$ (۳)

$CaCl_2$ ، KNO_3 ، $NaCl$ ، $Ca_3(PO_4)_2$ (۴)

کد دفترچه سوالات : ۱

-۲۱- معادله حالت گاز کامل $PV=nRT$ است ، که در آن n تعداد مول گاز را نشان می دهد. با توجه به حجم مولی گازها در شرایط STP مقدار ثابت R بر حسب $\text{atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ کدام است؟

۸/۳۱۴ (۴)

۰/۰۸۲۰۵ (۳)

۰/۰۸۳۱۴ (۲)

۸/۲۰۵ (۱)

-۲۲- هرگاه طی یک واکنش ، ۱ مول گاز از یک واکنش دهنده جامد یا مایع در دمای $K = ۳۰۰$ و فشار ثابت ۱ اتمسفر تولید شود ، در نتیجه آن کاری برابر با ۲۵۰۰ از سامانه واکنش روانه محیط اطراف می شود. با توجه به آن، ΔE واکنش انفجار نیتروگلیسیرین $C_3H_5(NO_3)_3(l)$ بر حسب کیلوژول بر مول در شرایط داده شده کدام است؟




-۲۲۵۵۵/۰ (۴)

-۲۳۱۴۵/۳ (۳)

-۲۲۲۲۸/۵ (۲)

-۲۲۲۲۴/۵ (۱)

-۲۳- واکنش $D \rightarrow B$ با توجه به شکل و معلومات داده شده ، بر حسب کیلوژول کدام است؟



$$\Delta H_4 = +150 \text{ kJ} , \Delta H_2 = -100 \text{ kJ} , \Delta H_1 = -200 \text{ kJ}$$

+۵۰ (۴)

+۱۵۰ (۳)

+۱۰۰ (۲)

-۱۵۰ (۱)

-۲۴- واکنش $A-A(g) + B-B(g) \rightarrow 2A-B(g)$ با توجه به آنتالپی استاندارد پیوند های داده شده بر حسب کیلوژول کدام است؟

$$\Delta H_{A-A}^0 = -18 \text{ kJ} , \Delta H_{B-B}^0 = -18 \text{ kJ} , \Delta H_{A-B}^0 = 28 \text{ kJ mol}^{-1}$$

-۱۵۶/۸ (۴)

-۲۲۴ (۳)

-۱۹۶ (۲)

-۱۷۰ (۱)

-۲۵- هرگاه ۱۰۰ گرم آب با دمای 80°C به عنوان یک سیستم بسته نا دمای 30°C در فشار ثابت سرد شود ، کدام گزینه در مورد ΔH و ΔE آب در این فرآیند درست است؟ حجم آب در جریان سرد شدن ثابت فرض می شود. گرمای ویژه آب برابر با $4/۱۸ \text{ J g}^{-1} \text{C}^{-1}$ می باشد.

$$\Delta E < \Delta H = -20/9 \text{ kJ} (۲)$$

$$\Delta E = \Delta H = -20/9 \text{ kJ} (۱)$$

$$\Delta E + \Delta H = -20/9 \text{ kJ} (۴)$$

$$\Delta E - \Delta H = +20/9 \text{ kJ} (۳)$$

-۲۶- آنتالپی استاندارد سوختن اتانول ، $C_2H_5OH(l)$ ، برابر با $-1371 \text{ kJ mol}^{-1}$ است. آنتالپی استاندارد تشکیل $CO_2(g)$ و $H_2O(l)$ در شرایط داده شده به ترتیب برابر با -294 و -286 کیلوژول بر مول است. آنتالپی استاندارد تشکیل اتانول در این شرایط بر حسب کیلوژول بر مول کدام است؟

-۲۷۵ (۴)


+۶۹۱ (۳)

-۶۹۱ (۲)

-۶۸۰ (۱)

کد دفترچه سوالات : ۱

۲۷- مقایسه ΔH° دو واکنش زیر در دما و فشار یکسان کدام است؟



$$\Delta H_1^\circ < \Delta H_2^\circ \quad (۲)$$

(۴) به معلومات بیشتر نیاز است.

$$\Delta H_1^\circ > \Delta H_2^\circ \quad (۱)$$

$$\Delta H_1^\circ = \Delta H_2^\circ \quad (۳)$$

۲۸- کدام گزینه در مورد یون های داده شده درست است؟

A: یونی که وجود آن در آب باعث سختی موقت می شود.

B: یونی که زیاد بودن غلظت آن در آب باعث به وجود آمدن سختی دائم می شود.

C: یونی که برای جلوگیری از پوسیدگی دندان به آب آشامیدنی می افزایند.

D: یونی که برای لخته کردن ذره های کلربنیدی، در هنگام تصفیه به آب اضافه می کند.

E: یونی که برای جلوگیری از رشد جلبک ها، به منابع آب اضافه می شود.

E	D	C	B	A	
Fe^{3+}	Cu^{2+}	F^-	HCO_3^-	Na^+	(۱)
Cu^{2+}	Fe^{3+}	F^-	Fe^{2+}	HCO_3^-	(۲)
Hg^{2+}	Fe^{3+}	F^-	Fe^{2+}	Na^+	(۳)
Cu^{2+}	F^-	Fe^{2+}	Fe^{3+}	HCO_3^-	(۴)

۲۹- یک نمونه دارای یک یا دو نوع کربنات از فلزات فلایابی خاکی می باشد. از تجزیه حرارتی ۲/۸۸ گرم از این نمونه ۰/۴۴۸ لیتر کربن دی اکسید در شرایط استاندارد آزاد می شود. اگر ۲ گرم از این نمونه را با ۲۰۰ میلی لیتر محلول ۱/۰ مولار HCl واکنش دهیم حجم کربن دی اکسید آزاد شده در شرایط استاندارد بر حسب لیتر چقدر است؟ ($Ba = ۱۳۷$ ، $Mg = ۲۴$ ، $Sr = ۸۷$ ، $O = ۱۶$ ، $C = ۱۲$ ، $Ca = ۴$).

$$(۱) ۰/۳۱۱ \quad (۲) ۰/۱۰۰ \quad (۳) ۰/۲۲۴ \quad (۴) اطلاعات کافی نیست$$

۳۰- ۱/۴۱ گرم پرکلریک اسید متبلور خالص O_xH_2O با ۲۰ mL $HClO_4.xH_2O$ محلول اضافی هیدروکسید باریم به غلظت ۱ M به طور کامل واکنش می دهد و ۲ گرم باریم پرکلرات تشکیل می شود. برای خشی کردن ۲۰ mL محلول KOH به غلظت ۱M چند گرم $MgCl_2$ مورد نیاز است؟ ($Ba = ۱۳۷/۳$ ، $Cl = ۳۵/۵$ ، $O = ۱۶$ ، $C = ۱۲$ ، $Ca = ۴$).

$$(۱) ۲/۷۳ \quad (۲) ۲/۱۰۱ \quad (۳) ۲/۳۷ \quad (۴) ۳/۰۹$$

کد دفترچه سوالات : ۱

۳۱- می خواهیم میزان یون های سولفید و کلرید را در یک نمونه فاضلاب تعیین کنیم. برای این کار ابتدا 50 mL از نمونه فاضلاب را با مقدار اضافی محلول AgNO_3 مخلوط می کنیم. در نتیجه $400\text{ mg Ag}_2\text{S}$ و AgCl رسوب در ته ظرف تشکیل می شود. به 50 mL دیگر از این نمونه فاضلاب اضافی ZnSO_4 می افزاییم که در نتیجه آن $mg ZnS$ ته نشین می شود. غلظت بون Cl^- در فاضلاب تقریباً چند ppm است؟ ($\text{Ag} = 108$ ، $\text{Cl} = 35/5$ ، $S = 32$ ، $\text{Zn} = 65$)


۱۸۲۹ (۴)

۱۵۶۷ (۳)

۱۷۷۶ (۲)

۱۳۸۲ (۱)

۳۲- در یک ظرف درسته، مطابق شکل زیر، دو ظرف A و B به ترتیب محتوی محلول آبی NaCl و آب مقطمر قرار می دهیم. اگر به سیستم زمان کافی برای رسیدن به تعادل بدهیم، وضعیت نهایی سیستم چه خواهد بود؟



(۱) بخشی از محتویات ظرف A به ظرف B منتقل می شود.

(۲) محتویات ظرف A کاملاً تبخیر شده و مقداری از آن به ظرف B منتقل می شود.

(۳) بخشی از محتویات ظرف B به ظرف A منتقل می شود.

(۴) محتویات ظرف B کاملاً تبخیر شده و مقداری از آن به ظرف A منتقل می شود.

۳۳- چگالی مخلوطی از کربن دی اکسید و اکسیژن در دما و فشار معین $1/357$ برابر چگالی گاز نیتروژن در همان دما و فشار است. نسبت جرم اکسیژن به کربن دی اکسید در این مخلوط چقدر است؟ ($N=14$ ، $O=16$ ، $C=12$)

۴۴ به ۳۲ (۴)

۲۲ به ۳۲ (۳)

۳۲ به ۲۲ (۲)

۳۲ به ۴۴ (۱)

۳۴- درصد جرمی کدام عنصر در پوسته زمین بیشتر است؟

(۱) کلسیم

(۲) سیلیسیم

(۳) آلومینیم

(۴) آهن

۳۵- فراوانی کدام منع آب موجود در کره زمین از همه کمتر است؟

(۱) رطوبت موجود در خاک


(۲) بخار آب موجود در هوا

(۳) آب های زیرزمینی

(۴) رودخانه ها، دریاچه ها، آبگیرها





کد دفترچه سوالات: ۱

۳۶- نام طرف آزمایشگاهی زیر کدام است؟



- (۱) بشر (۲) بالن حجمی (۳) استوانه مدرج (۴) ارلن

۳۷- در ترکیبات CH_3I و CH_3F کدام یک به ترتیب بیشترین نقطه چوش و بیشترین انحلال پذیری در آب را دارد؟



۳۸- سیکلوهگزان در کدام یک از محلول های زیر کمترین انحلال پذیری را دارد؟

- (۱) پنتانول (۲) دی‌تیل اتر (۳) آتانول (۴) هگزان

۳۹- ابتدای نام ترکیبی با فرمول پسته $\text{C}_{11}\text{H}_{24}$ بر روی برچسب طرف آن پاک شده است و فقط ".....پروپیل هیتان" قابل تشخیص است. چند ساختار برای این ترکیب مختص است؟

